

MIEDZIOTON 50 PLUS

Prosty nieorganiczny nawóz mikroelementowy z miedzią i borem

Skład nawozu:

Miedź (Cu) całkowita zawartość – 50%
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie – 0,2%

Składniki:

Trihydroksychlorek dimiedzi⁽¹⁾ (CAS nr 1332-65-6);
Pentahydrat tetraboranu sodu⁽¹⁾ (CAS nr 12179-04-3)
⁽¹⁾CMC – Substancje i mieszaniny na bazie materiału surowego.



Dystrybutor:
CALFERT Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
tel. 22 456 19 65
biuro@calfert.pl
www.calfert.pl

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ DO ZABIEGÓW DOLISTNYCH

Przed użyciem nawozu Miedzioton 50 Plus napelnąć zbiornik opryskiwacza w 75% wodą, włączyć mieszało w opryskiwaczu. Do zbiornika dodać odmierzoną ilość nawozu Miedzioton 50 Plus, nie przekraczając zalecanych dawek, następnie można dodać inne preparaty. Uzupełnić ciecz roboczą w zbiorniku opryskiwacza do wymaganej objętości. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszało powinno być włączone. Po wykonaniu zabiegu i opróżnieniu zbiornika wszystkie elementy opryskiwacza należy dokładnie umyć lub przepłukać czystą wodą.

MIESZALNOŚĆ

Nawóz Miedzioton 50 Plus ma ograniczenia w mieszaniu z innymi produktami. Nie należy nawozu mieszać z preparatami fosforowymi, siarkowymi, miedziowymi, wapniowymi, a także z preparatami zawierającymi miedź w innych formach oraz z preparatami aminokwasowymi i olejowymi. Nie należy mieszać produktu z substancjami o odczynie alkalicznym. Każdorazowo przed sporządzeniem mieszaniny należy sprawdzić zdolność mieszania poszczególnych preparatów w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszaninę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

PRZECIECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu w maksymalnie 3 warstwach. Produkt przechowywać w pomieszczeniach odpowiednio wentylowanych, chłodnych i suchych, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Temperatura przechowywania od 5°C do 35°C. Przy rozsypaniu należy zebrać ciecz, a powierzchnię splukać dużą ilością wody. Należy stosować środki ochrony indywidualnej.

Zawiera

trihydroksychlorek dimiedzi (EC: 215-572-9)
pentahydrat tetraboranu disodu (CAS: 12179-04-3)

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H360FD – Może uszkadzać płodność. Może uszkadzać płód.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

EUH032 – W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

P201 – Zasięgnąć specjalnych instrukcji przed użyciem.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P202 – Nie stosować produktu przed przeczytaniem i zrozumieniem wszystkich ostrzeżeń.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/aerozolu.

P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/twarzy.

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarzem.

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:



ZALECENIA – aplikacja dolistna

Należy stosować się do zaleceń i nie przekraczać zalecanych dawek.

Uprawa	Termin stosowania	Dawka
Jabłoń, grusza	Po ruszeniu wegetacji: 2 zabiegi. Po zbiorach owoców: 2-3 zabiegi.	1,5 kg/ha
Wiśnia, czereśnia, śliwa	Wczesną wiosną, po ruszeniu wegetacji: 2 zabiegi. Jesienią, w momencie wchodzenia roślin w okres spoczynku zimowego: 2-3 zabiegi.	3 kg/ha
Truskawka, malina	Wczesną wiosną, po ruszeniu wegetacji: 2 zabiegi. Jesienią, w momencie wchodzenia roślin w okres spoczynku zimowego: 2-3 zabiegi.	1-1,5 kg/ha
Brzoskwinia	Wczesną wiosną: 2 zabiegi. Jesienią, po zakończeniu wegetacji: 2 zabiegi.	3-5 kg/ha
Porzeczka	Wczesną wiosną, po ruszeniu wegetacji: 2 zabiegi. Jesienią, w momencie wchodzenia roślin w okres spoczynku zimowego: 2-3 zabiegi.	3 kg/ha
Winorośl	Na początku sezonu wegetacyjnego oraz w momencie wchodzenia roślin w okres spoczynku zimowego: 1-3 zabiegi w sezonie w odstępach co 10-14 dni.	1,5-2,5 kg/ha
Pomidor	2-3 tygodnie po wysadzeniu rozsady: zabiegi co 7-14 dni.	1,5-3 kg/ha
Ogórek	Od fazy, gdy na pedzie głównym otworzy się drugi kwiat, do fazy, gdy owoc na pedzie głównym osiąga kształt i wielkość zbiorczą: 1-3 zabiegi co 14 dni.	1,5-3 kg/ha
Fasola szparagowa	W okresie kwitnienia i po kwitnieniu: 1-2 zabiegi w sezonie w odstępach co 7-10 dni.	1,5-2,5 kg/ha

NIEBEZPIECZEŃSTWO



UFI:9K80-K08V-W00C-TVTV

UN3077 ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE N.O.S.
(Coper oxychloride EC:215-572-9)

5H4/Z10,2/S/20/B/1343-110042

9

10 kg
C €