

# BLACKJAK®

Zawartość netto:  
**5L**

Blackjak jest skoncentrowaną zawiesiną Leonardytu. Poprawia rozwój systemu korzeniowego.



# BLACKJAK®

**BLACKJAK jest skoncentrowaną wodną zawiesiną Leonardytu. Dzięki unikalnej metodzie wytwarzania zachowuje wszystkie zawarte w nim składniki, przede wszystkim huminy oraz kwasy ulmowe.**

### BLACKJAK:

- poprawia wzrost i rozwój korzeni, w szczególności korzeni włośnikowych,
- poprawia wyrównanie kiełkowania nasion oraz wschody,
- ułatwia pobieranie składników pokarmowych poprzez zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych korzeni,
- przyspiesza wzrost i rozprzestrzenianie się korzystnych mikroorganizmów glebowych w strefie wokół korzeni,
- ogranicza negatywne skutki zasolenia oraz zanieczyszczenia gleby agrochemikaliami,
- dodawany do nawozów dolistnych poprawia ich przyswajalność.

**BLACKJAK** może być stosowany w uprawach wszystkich roślin warzywniczych, sadowniczych oraz rolniczych.

### Skład:

- Leonardyt: min. 28%
- Zawartość substancji organicznej: min. 20%
- Huminy, kwasy ulmowe, kwasy humusowe, kwasy fulwowe

**pH: 3,5–5**

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

| UPRAWA                  | DAWKI i TERMINY (ilość wody dostosować do specyfiki uprawy i stadium rozwoju roślin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziemniaki               | Pierwszy zabieg wykonać, gdy rośliny osiągną 20–25 cm, kolejny zabieg powtórzyć po 2–3 tyg. Dawka: 2 l/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zaprawianie sadzeniaków | Stosować od 100 do 200 ml/1 l wody na 100 kg sadzeniaka, można stosować łącznie z chemicznymi zaprawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marchew, pietruszka     | Pierwszy zabieg wykonać, gdy nać osiągnie 10–15 cm, drugi zabieg powtórzyć po 2–3 tyg. Dawka: 1 l/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warzywa z rozsady       | Moczyć lub podlać rozsadę przed wysadzeniem używając 250 ml na rozsadę przewidzianą na powierzchnię 1 ha (zalecana ilość wody: ok. 100 litrów).<br>Ok. 14 dni po wysadzeniu rozsady w pole stosować dawkę 2 l/ha /300–500 litrów wody.<br>W przypadku stosowania przez system irygacyjny dawka 250 ml/100 litrów wody, zabieg można powtórzyć po ok. 14 dniach.                                                                                                                              |
| Sady                    | <b>Nowe nasadzenia:</b> moczyć korzenie drzewek przed wysadzeniem, stosując dawkę 250 ml/100 litrów wody.<br><b>Po ruszeniu vegetacji</b> stosować fertygację 300–500 ml/1000 l wody.<br>Stosować dolistnie wraz z nawozami i środkami ochrony roślin w dawce 50 ml/100 litrów wody.<br><b>W optymalnych temperaturach (&gt;18°C) stosowany łącznie z giberelinami pozwala ograniczyć ich dawkę o 15-20%. W niższych temperaturach (14-18°C) poprawia transport i efektywność giberelin.</b> |
| Truskawki               | <b>Nowe nasadzenia:</b> moczyć sadzonki przed wysadzeniem, używając 250 ml/100 litrów wody.<br><b>2 tygodnie po wysadzeniu</b> stosować dawkę 2 l/ha.<br><b>W drugim lub trzecim roku uprawy:</b> zabieg wykonać po ruszeniu vegetacji dawkę 2 l/ha, powtórzyć po ok. 15 dniach.                                                                                                                                                                                                             |

## PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNAĆ

### POZOSTAŁE ZALECENIA

**Przyspieszanie wschodów.**  
Nasiona małe: podlać bezpośrednio po siewie używając 250 ml/100 litrów wody.  
**Nawadnianie kropelkowe (Fertygacja):** bezpośrednio po wysadzeniu 300–500 ml/1000 litrów wody, zabieg powtarzać co 3–4 tygodnie.  
**Dodatek do nawozów dolistnych** (lepsze wykorzystanie nawozów): 50 ml/100 litrów wody.  
UWAGA: Nawożenie dolistne nie zastępuje standardowego programu nawożenia doglebowego.  
**Buforowanie cieczy opryskowej w celu obniżenia pH:** 50 ml/100 litrów wody.  
**Nie stosować z jakimkolwiek zwilżaczem.**  
Szczegółowych informacji należy szukać na [www.bioagris.pl](http://www.bioagris.pl).

### MIESZANIE

**BLACKJAK** można mieszać z większością znanych nawozów dolistnych i agrochemikaliów.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Po pracy umyć ręce wodą z mydłem. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, dokładnie zamknięte w suchym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od dzieci, zwierząt i żywności. W razie wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody.

### PRZESTRZEGAĆ ZASAD TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA:

Chronić przed następczeniem. Przechowywać w temp. -5°–35°C. Okres przydatności do stosowania – 3 lata. Ilość warstw w czasie transportu/składowania – 4 warstwy.

Produkt wprowadzany do obrotu zgodnie z Art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu

# BLACKJAK®

BAR CODE GOES HERE

Dystrybutor:  
**Bioagris Sp. z o.o.** spółka komandytowa  
ul. Lubawska 4A, 03-011 Warszawa  
info@bioagris.pl, tel.: +48 793 797 757

Producent:  
Sipeam Inagra,  
Carretera Mareny Blau,  
46410 Sueca (Va), Hiszpania