

HELP PLANT Bor

Produkt do eliminowania niedoborów Boru oraz skutków jego braku w roślinach.

Bor (B) jest najbardziej deficytowym składnikiem w glebach Polski. Większość gleb uprawnych charakteryzuje się niską zawartością tego składnika. Pierwiastek ten jest odpowiedzialny za prawidłowy wzrost organów generatywnych, wpływa na kwitnienie, procesy oddychania, gospodarkę wodną oraz reguluje przemiany węglowodanów. W następstwie niedostatecznego stanu odżywienia borem, rośliny nie wytwarzają kwiatów, następuje obumieranie stożków wzrostu części nadziemnych, jak również korzeni. Długotrwały deficyt boru prowadzi do zmian ilościowych i jakościowych uzyskanego plonu.

Zalety Help Plant Bor:

- skutecznie likwiduje deficyty boru,
- dostarcza lepiej przyswajalną i wykorzystywaną przez rośliny organiczną formę boru,
- umożliwia prawidłowe kwitnienie,
- eliminuje obumieranie stożków wzrostu korzeni oraz pędów nadziemnych.

- Help Plant Bor umożliwia wsparcie roślin w przypadku zaburzeń fizjologicznych takich jak:

- zaburzenia we wzroście pędów,
- deformacje owoców,
- deformacje i kruszenie liści wierzchołkowych,
- obumieranie stożków wzrostu części nadziemnych,
- obumieranie końcówek korzeni,
- słabe zawiązywanie kwiatów i owoców.

Instrukcja stosowania Help Plant Bor

UWAGA! Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem, przy temp. maks. 25°C. Temp. cieczy użytkowej min. 10°C.

W PRZYPADKU ZAMIARU ŁĄCZENIA PRODUKTU Z INNYM ŚRODKIEM, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ MIESZANIA I SPRAWDZIĆ REAKCJĘ ROŚLIN NA MIESZANINĘ.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie, w przypadku niedoboru boru.

Produkt należy stosować w formie oprysku po uprzednim rozcieńczeniu wodą wg załączonej poniżej tabeli. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Uprawa	Termin oprysku	Dawka produktu (ml/100 m ² powierzchni uprawnej)	Ilość wody (l/100 m ² powierzchni uprawnej)
ziemniak	1-2 opryski przed kwitnieniem, co 10-14 dni	10-20	2-3
rośliny strączkowe	przed i po kwitnieniu	10-20	2-3
pozostałe warzywa*	2 opryski w czasie intensywnego wzrostu	10-20	2-3
truskawka	początek pąkowania, początek kwitnienia	10-20	2-3
drzewa i krzewy owocowe	różowienie pąków, po kwitnieniu, początek wzrostu zawiązków, po zbiorach przed opadaniem liści	10-30	4-10
inne (rośliny ozdobne, inne rośliny wymagające wysokiego nawożenia borem)	20-50 ml/10 l wody		

*poza burakami cukrowymi, pastewnymi, rzepakiem, kukurydzą

Warunki przechowywania

Przechowywać w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła i słońca, w temperaturze od -5°C do 30°C. W produkcie może wystąpić dopuszczalna niewielka ilość osadu.

Piktogramy (słońce, temperatura od -5 do +30° C, parasol, liczba warstw na palecie – 20 ml-13 warstw)

Środki ostrożności i warunki bhp

Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu etykietę. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku rozlania należy niezwłocznie go zebrać, a pozostałość zmyć wodą.

Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania.



Okres ważności - 3 lata, gdy produkt przechowywany jest prawidłowo, zgodnie z instrukcją warunków przechowywania.

Kod EAN

HELP PLANT Bor

20 ml

Projekt graficzny

PFC 1(C)(II)(a) Prosty nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy

Skład nawozu (% m/m):

11,0% bor (B) całkowity;

11,0% boroetanoamina.

Nawóz zawiera azot (4,7%)

Składniki: boroetanoamina¹ (nr CAS: n.d., nr WE: 701-024-0), gdzie ¹ oznacza CMC 1 - surowce pierwotne i mieszaniny.

Objętość netto: 20 ml

„SUMIN”

D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy sp. j.

64-605 Wargowo, Świerkówki 15A

tel. 61 29 72 600

www.sumin.com.pl

Data produkcji, numer partii: