

L-Amino +[®] K

**Biostymulujący nawóz
organiczno-mineralny**

Do stosowania dolistnego i dokorzeniowego

- w uprawach konwencjonalnych
- w uprawach ekologicznych

**SZYBKO
PRZYSWAJALNY
POTAS (K⁺)**

Biologicznie aktywne

L-α WOLNE AMINOKWASY

Z HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ

HISTYDyna	SERYNA	ARGININA	GLICyna	KWAS ASPARAGINOWY	KWAS GLUTAMINOWY	
TREONINA	ALANINA	PROLINA	CYSTEINA	LIZYNA	TYROZYNA	METIONINA
WALINA	IZOLEUCYNA	LEUCYNA	FENYLOALANINA	TRYPTOFAN		

 Zawiera
18 naturalnych
aminokwasów L-α
z hydrolizy enzymatycznej
Marka PREMIUM



SYBKO PRZYSWAJALNY **Potas (K⁺)**

L-Amino[®]K

z NATURALNYMI **L-α aminokwasami**

L-Amino[®] K Aminokwas Naturalne do profesjonalnych zastosowań

- Specjalistyczny środek do zapobiegania i korekty niedoborów potasu (K) z technologii L-Amino[®].
- Zawiera potas (K) w formie szybko i łatwo przyswajalnej przez rośliny oraz biologicznie aktywne naturalne wolne L-α aminokwasy powstałe z hydrolizy enzymatycznej.

ZAPEWNIĄ:

- lepszy transport wody i składników pokarmowych
- łatwie i szybkę dostarczenie potasu do wnętrza tkanek
- poprawę wybarwienia owoców, ich wielkość oraz wyrównanie

Zastosowanie unikalnej technologii produkcji L-Amino[®] K zapewnia szybkie dostarczenie potasu oraz aminokwasów do najbardziej potrzebujących miejsc w roślinie oraz jego maksymalne wykorzystanie poprzez łatwą transpirację do tkanek dzięki naturalnym biologicznie aktywnym aminokwasom L-α.

Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu:

Dawki, terminy i sposób stosowania

Uprawa	Stosowanie	Dawka i kha (jednosteczne)	Odstępnie %	Ilość cieczy roboczej (l/ha)	Termin
Jabłko	Doliste	2-3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-750	Wykonać łącznie 7-9 zabiegów: - 1 w fazie wstępnego wzrostu i powtórzyć po 7 dniach, - 1 w okresie od zawiązania do zrizerwania zrytu, - 3-4 w odstępach co najmniej 7 dni w okresie od zawiązania kwiatostanów do 6-7 tygodnia wzrostu zawiązanych, - 2-3 wykonaw w okresie dojrzewania owoców.
Grusza	Doliste	2-3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-750	Wykonać łącznie 5-6 zabiegów: - 2 odpowiednio po zawiązaniu się liści rozkwitających/kwitających oraz w fazie pełnego kwiatostanu, - 3-4 co 7-14 dni od końca kwiatostanu do zrizerwania owoców.
Witka, Cerealia, Słona, Krowosłona, Mielna	Doliste	2-3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-750	Wykonać łącznie 5-6 zabiegów: - 2 zabiegów odpowiednio po zawiązaniu się pierwiastków liści oraz na początku kwiatostanu, - 4 zabiegów co 7-14 dni od końca kwiatostanu do zrizerwania owoców.
	Odkorzennowo	8-12 łączna dawka nawozu w całym sezonie 40 l/ha			Wykonać zabiegów co 7-14 dni od końca kwiatostanu do początku zbioru owoców.
Truskawka	Doliste	2 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-600	Wykonać łącznie 4-5 zabiegów: - 1 po pojawieniu się pierwiastków liści, - 3-4 co 10-14 dni w okresie od pojawienia się pierwszych zawiązanych do końca zbioru owoców.
Malina, porzeczka, czarna, czerwona, biała	Doliste	2 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-750	Wykonać łącznie 4-6 zabiegów: - 1 po pojawieniu się pierwiastków liści, - 3-5 co 10-14 dni w okresie od pojawienia się zawiązanych do zbioru owoców.
	Doliste	2 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-600	Wykonać łącznie 4-5 zabiegów: - 2 co 7-10 dni w przypadku stwierdzenia objawów niedoborów potasu oraz - przed sporządzeniem suszonych owoców w warunkach uprawy na soku.
Pasztaki rośliny jagodowe	Odkorzennowo	8-12 łączna dawka nawozu w całym sezonie 40 l/ha		300-600	Wykonać zabiegów co 7-14 dni od końca kwiatostanu do początku zbioru owoców przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniania.
Pomidór gruntowy, Papryka, Bakłażan	Doliste	2-3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać łącznie 2-4 zabiegów: - 1-2 co 7-10 dni w czasie dorozwiania pierwiastków owoców, - 1-2 co 7-10 dni w fazie wzrostu owoców.
Kapusta polska i głowiasta	Doliste	3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać 2-3 zabiegów co 7-10 dni w fazie wypełniania się głowic.
Kalafior, Brokuł	Doliste	3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać łącznie 2-4 zabiegów: - 1-2 co 7-10 dni w fazie formowania się rzy, - 1-2 co 7-10 dni w fazie intensywnego dorozwiania rzy.
Cebula	Doliste	2-3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać 1-2 zabiegów co 7-10 dni w fazie intensywnego wzrostu głowic.
Opinok	Doliste	2-3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać łącznie 2-4 zabiegów: - 1-2 po pierwszym zbiorze, - 1-2 w fazie intensywnego dorozwiania liści.
Marchew, Pietruszka, Korak	Doliste	2-3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać łącznie 2 zabiegów: - 1 w fazie grubienia korzenia, - 2 zabiegów co 7-10 dni w fazie intensywnego wzrostu korzenia.
Ziemniak	Doliste	2-3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać łącznie 3 zabiegów: - 1 w fazie wigania się pąków kwiatowych, - 2 zabiegów co 7-10 dni w fazie intensywnego wzrostu bulwy.
	Doliste	2-3 (300-400 ml nawozu w 100 l wody)	0,3-0,4% (300-400 ml nawozu w 100 l wody)		Zabiegów wykonywać co 7-14 dni w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej.
Pasztaki uprawy warzywnicze	Odkorzennowo	8-12			Zabiegów wykonywać co 7-15 dni podczas wegetacji.

Skład:

Wolne aminokwasy.....	5,00% (m/m)
Potas (K ₂ O).....	24,00% (m/m)
Azot całkowity (N).....	1,00% (m/m)
Postać.....	plynny, roztwór

Sposób sporządzania cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalili potrzebnią jej ilość. Odmierzoną ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściową wodą (z włączonym mieszałem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popluczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparatę dokładnie umyć.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 0°C do +30°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od dzieci, zwierząt i żywności.

Środki ostrożności

Podczas prac z nawozem używać odzieży ochronnej, okularów i rękawic gumowych. W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Po pracy umyć ręce wodą z mydłem.

Uwaga

- Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla uprawy w plonie głównym (N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odnozu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Programu azotanowego;
- Zabrania się stosowania nawozu na glebach zamaryżowanych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamaryżowane nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchnię w ciągu dnia;
- Nie przewiduje się stosowania nawozu łącznie ze środkami ochrony roślin.

Zakres stosowania

Nawóz organiczno-mineralny „L-Amino + K Aminokwas Naturalne do profesjonalnych zastosowań” zawierający w swoim składzie naturalne wolne L-α aminokwasy może być stosowany w uprawie roślin warzywnych i sadowniczych. Nawóz organiczno-mineralny „L-Amino + K Aminokwas Naturalne do profesjonalnych zastosowań” polecany jest do stosowania dolistnego i doglebowego, w tym fertygacji.

Producent:
Biopharmaceutech Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Gruszowa 47, 42-215 Częstochowa, Polska
tel.: +48 34 366-54-99, biuro@agro-sorb.com
www.agro-sorb.com



Dercja MRiRW nr 640/20

Okrę przydatności:
3 lata od daty produkcji

masa netto:

6,65 kg / 5L