

Posiadacz zezwolenia:

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, www.agro.bayer.com.pl

DECIS® TRAP DROSO

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,015 g /pułapkę

Zezwolenie MRiRW nr R-6/2024 z dnia 15.01.2024 r.



Niebezpieczeństwo

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

ATRAKTANT i INSEKTYCYD w formie jednorazowej, gotowej do użycia pułapki, przeznaczonej do ograniczania populacji muszki plamoskrzydłej.

Pułapka Decis Trap Droso składa się z podstawowej części zawierającej mieszaninę atraktantów specyficznych dla muszki plamoskrzydłej i pokrywkę impregnowanej insektycydem od wewnętrznej strony. Jej działanie opiera się na metodzie „attract and kill”. Po umieszczeniu pułapek na roślinach postacie dorosłe szkodnika są do nich wabione. Wewnątrz pułapek w wyniku kontaktu z insektycydem owady te giną. Pułapka zawiera substancję czynną - deltametryna, związek z grupy pyretroidów (wg klasyfikacji IRAC grupa 3A).

STOSOWANIE ŚRODKA

Pułapka przeznaczona do ręcznego zawieszania na roślinach.

Borówka wysoka (amerykańska) (w uprawie polowej, w uprawie w szklarni i pod osłonami)

Muszka plamoskrzydła

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 pułapek/ha (maksymalnie 1 pułapka na krzew).

Termin stosowania środka: Pułapki zawiesić z początkiem pierwszych nalotów szkodnika, w okresie od fazy początku wzrostu owocu (widoczne pierwsze owoce na gronie) do fazy początku opadania owoców (pierwsze opadają owoce znajdujące się u podstawy grona) (BBCH 71-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

*Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik*

Wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela, nektaryna, śliwa

Muszka plamoskrzydła

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 pułapek/ha (maksymalnie 1 pułapka na drzewo).

Termin stosowania środka: Pułapki zawiesić z początkiem pierwszych nalotów szkodnika, w okresie od fazy rozwoju zalążni do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71- 89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żurawina, porzeczka czerwona, porzeczka biała, porzeczka czarna, agrest, malina, jeżyna (w uprawie polowej, w uprawie w szklarni i pod osłonami))

Muszka plamoskrzydła

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 pułapek/ha (maksymalnie 1 pułapka na krzew).

Termin stosowania środka: Pułapki zawiesić z początkiem pierwszych nalotów szkodnika w okresie od fazy początku wzrostu owocu (widoczne pierwsze owoce na gronie) do fazy początku opadania owoców (pierwsze opadają owoce znajdujące się u podstawy grona) (BBCH 71-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Aktinidia (w uprawie polowej, w uprawie w szklarni i pod osłonami)

Muszka plamoskrzydła

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 pułapek/ha (maksymalnie 1 pułapka na roślinę).

Termin stosowania środka: Pułapki zawiesić z początkiem pierwszych nalotów szkodnika w okresie od fazy początku wzrostu owocu ($\geq$ BBCH 71).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Winorośl (w uprawie polowej, w uprawie w szklarni i pod osłonami)

Muszka plamoskrzydła

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 pułapek/ha (maksymalnie 1 pułapka na krzew).

Termin stosowania środka: Pułapki zawiesić z początkiem pierwszych nalotów szkodnika, w okresie od fazy zawiązywania owoców (zawiązki owoców zaczynają się formować i powiększać, pozostałości kwiatów opadają) do fazy, gdy jagody są dojrzałe do zbioru (BBCH 71-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Truskawka, poziomka (w uprawie polowej, w uprawie w szklarni i pod osłonami)

Muska plamoskrzydła

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 pułapek/ha (maksymalnie 1 pułapka na roślinę).

Termin stosowania środka: Pułapki zawiesić z początkiem pierwszych nalotów szkodnika, w okresie od fazy rozrostu dna kwiatowego do fazy zbioru głównego, gdy większość owoców jest wybarwiona (BBCH 71-87).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Pułapki należy zawiesić równomiernie w obrębie sadu. Na obrzeżach większych upraw zaleca się zwiększenie zagęszczenia pułapek, nie przekraczając jednocześnie maksymalnej dopuszczalnej dawki dla jednorazowego zastosowania.

Pułapkę należy zawiesić pośrodku rośliny pod osłoną liści w taki sposób, aby nie była narażona na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Należy zwrócić uwagę, by otwory w pułapce nie były zablokowane przez liście.

Czas trwania ochrony wynosi 100 dni.

Aby osiągnąć wystarczającą ochronę przed muszką plamoskrzydłą przez cały sezon, stosowanie pułapek Decis Trap Droso powinno być tylko częścią przyjętego programu ochrony uprawy, w którym przewidziane są również zabiegi środkami owadobójczymi zarejestrowanymi do zwalczania tego szkodnika.

Po zakończeniu sezonu wegetacyjnego pułapki należy zdjąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strategia zarządzania odpornością:

Pułapka zawiera substancję czynną deltametryna, związek z grupy pyretroidów (wg klasyfikacji IRAC grupa 3A – substancje działające na układ nerwowy owada – modulatory kanałów sodowych). W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności szkodnika w przyjętym programie ochrony należy uwzględnić stosowanie środków owadobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup wg klasyfikacji IRAC, o odmiennym mechanizmie działania.

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Niewymagany

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon) w trakcie wieszania pułapek.

Pułapki są gotowe do użycia, nie wymagają dodatkowego montażu przed ich zawieszeniem w uprawie. Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z deltametryną lub atraktantem, nie należy otwierać pułapek ani saszetek z atraktantem.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0 °C – 30 °C
- nie dłużej niż 6 miesięcy.

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu wyposażonym w wentylację ogólną.

Chronić przed mrozem.

Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

POSTĘPOWANIE Z PUSTYMI OPAKOWANIAM

Puste opakowania i zużyte pułapki należy zwrócić do punktów zbiórki odpadów przeznaczonych do tego celu. Puste opakowanie nie może być ponownie użyte do innych celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody lub wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.

Okres ważności – 6 miesięcy

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -