

Dystrybutor: Biocont Polska Sp. z o.o.,
ul. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków,
tel: +48 12 416 25 81Producent: POLISENIO s.r.l.,
Via S. Andrea 12,
48022 Lugo (RA), Italia

SULFICAL

nawóz siarkowo-wapniowy

Składniki:

wielosiarczek wapnia 38%, CAS: 1344-81-6

H319 Działa drażniąco na oczy.**H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.**H315** Działa drażniąco na skórę.**H317** Może powodować reakcję alergiczną.**H400** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne**P261** Unikać wdychania oparów lub aerozoli.**P280** Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i okulary ochronne / osłonę twarzy.**P30 + P351 + P338** W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać przez kilka minut wodą. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są one rozmieszczone i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie.**P302 + P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.**EUH031** Uwalnia toksyczny gaz w kontakcie z kwasami**EUH401** Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania, aby uniknąć ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska

Przed użyciem przeczytać instrukcję stosowania.



Właściwości chemiczne i fizyczne	
Właściwość	Wartość
Siarka jako S (%)	23
Wapń jako Ca (%)	7
Odczyn pH	10-11

Nawóz SULFICAL jest skoncentrowanym źródłem siarki w postaci dobrze tolerowanej i przyswajalnej przez rośliny. Dodatkowo zawiera wysokie stężenie rozpuszczalnego w wodzie wapnia.

Zastosowanie i aplikacja:

Uprawa	Dawka	Aplikacja
Drzewa ziarnkowe i pestkowe	5 – 10 l/ha	Aplikacja poprzez opryskiwanie roślin. Wydatek cieczy - 400-1000 l / ha . Stosować niższe dawki preparatu w wyższych temperaturach. Stężenie cieczy roboczej: 1-2 % . Stosowanie w okresie kwitnienia może powodować przerzedzenie kwiatów.
Winorośl	2,5 – 10 l/ha	Aplikacja poprzez opryskiwanie roślin. Wydatek cieczy - 200-250 l / ha . Stosować niższe dawki preparatu w wyższych temperaturach. Stężenie cieczy roboczej: 1-4 % .
Rośliny oleiste, kapustowate, cebulowe	8 - 12 l/ha	Aplikacja poprzez opryskiwanie roślin. Wydatek cieczy - 600-1000 l / ha . Stosować na rośliny o dużym zapotrzebowaniu pokarmowym na siarkę.
cebula, czosnek	roztwór 4%	Wczesne nawożenie w formie moczenia materiału rozmnożeniowego przez 6 - 12 godzin w 4% roztworze produktu. Przed posadzeniem pozostawić sadzonki do wyschnięcia po moczeniu

Wskazówki bezpieczeństwa:

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem. Używać odzieży ochronnej. Zapewnić pracę w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie mieszać z kwasami. Unikać uwolnienia się preparatu do środowiska.

Ochrona dróg oddechowych: Materiał filtrujący lub półmaska z materiału filtrującego.

Ochrona rąk: rękawice gumowe lub plastikowe. Ochrona skóry: odzież ochronna zakrywająca całe ciało. Ochrona oczu: okulary ochronne lub osłona twarzy. Ochrony głowy: nakrycie głowy. Ochrona stóp: obuwie robocze lub ochronne. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy i po jej zakończeniu. Po zakończonej pracy ściągnąć odzież ochronną i dokładnie oczyścić, nie używać ponownie przed oczyszczeniem.

Pierwsza pomoc:

Wskazówki ogólne: W przypadku problemów zdrowotnych (ból głowy, łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie oczu, podrażnienie skóry lub podejrzenia reakcji alergicznej, trudności w oddychaniu), lub w przypadku wątpliwości poinformować lekarza i podać mu informacje na etykiecie lub karcie charakterystyki.Wdychanie: Przerwać ekspozycję, wyjść poza strefę zastosowania. Kontakt z oczami: Usunąć soczewki kontaktowe. Natychmiast przepłukać oczy, tzn. przepłukiwać otwarte oczy, szczególnie pod powiekami, przez 15 min czystą, bieżącą wodą. Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast opłukać i wymyć zanieczyszczone części skóry wodą. Przypadkowe połknięcie: Wypluć usta wodą, wypić szklankę wody. Nie wywoływać wymiotów. Uzyskaj pomoc medyczną i pokaż etykietę lub kartę charakterystyki.

Usuwanie opakowania i pozostałej części preparatu:

Pozostałości po opryskaniu rozcieńczyć i zużyć na opryskaną wcześniej powierzchnię. Puste pojemniki oddać do zorganizowanego punktu zbiórki surowców wtórnych.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5-30°C, chronić przed gorącem i bezpośrednim nasłonecznieniem

Data produkcji i numer partii: podane na opakowaniu

Okres przydatności do użycia: 2 lata od daty produkcji

Pojemność: 20 l