

MONOTON BOR 150

Skład nawozu (% m/m):

Bor (B) w postaci boroetanoloaminy rozpuszczalnej w wodzie - 11%

Składniki:

Boroetanolamina - CAS 26038-87-9⁽¹⁾

⁽¹⁾CMC1: Pierwotne surowce i mieszaniny



Mineralny nawóz mikroskładnikowy (PFC 1(C)(II)(a))
Nawóz mikroskładnikowy w postaci roztworu,
zawierający mikroskładnik pokarmowy, jakim jest bor.

OPIS PRODUKTU

Monoton BOR 150 to płynny nawóz dolistny do stosowania w uprawie roślin jagodowych, sadowniczych, warzywniczych, uprawianych w polu i pod osłonami. Monoton BOR 150 dostarcza roślinom doskonale przyswajalny bor niezbędny w okresie deficytu tego pierwiastka lub w okresach, gdy pobieranie boru jest ograniczone. Szczególnie zaleca się aplikację tego produktu na początku sezonu wegetacyjnego, przed kwitnieniem oraz na zakończenie okresu wegetacji. Uzupełnienie boru poprzez dolistną aplikację nawozu Monoton BOR 150 przed kwitnieniem wspiera procesy zapłodnienia i zawiązywania owoców, reguluje procesy kwitnienia, wzmacnia rozwój roślin, zapobiega pękaniu owoców, poprawia odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym na przymrozki, a stosowany na koniec wegetacji poprawia mrozoodporność roślin. Jest przy tym łagodny dla środowiska.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ DO APLIKACJI DOLISTNEJ

Przed użyciem nawozu Monoton BOR 150 należy wstrząsnąć opakowaniem. Napełnić zbiornik opryskiwacza w 75% wodą, włączyć mieszadło w opryskiwaczu. Do zbiornika dodać odmierzoną ilość nawozu Monoton BOR 150, nie przekraczać zalecanych dawek. Następnie można dodać inne preparaty. Uzupełnić ciecz roboczą w zbiorniku opryskiwacza do wymaganej objętości. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszadło powinno być włączone. Po wykonaniu zabiegu i opróżnieniu zbiornika wszystkie elementy opryskiwacza należy dokładnie umyć, przepłukując czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu, układając maksymalnie w trzech warstwach. Chronić przed deszczem oraz promieniowaniem słonecznym. Temperatura przechowywania od 5°C do 35°C. Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu. Przy rozładunku należy zebrać ciecz, a powierzchnię splukać dużą ilością wody. Należy stosować środki ochrony indywidualnej.

MIESZALNOŚĆ

Nawóz Monoton BOR 150 może wykazywać różne zdolności do tworzenia mieszanin. Nie mieszać z preparatami zasadowymi. Każdorazowo przed stworzeniem mieszaniny należy sprawdzić zdolność mieszania poszczególnych preparatów w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszaninę na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ani producent, ani dystrybutor nawozu nie odpowiadają za szkody i wady powstałe w wyniku sporządzanych mieszanin zbiornikowych. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania i zalecanych dawek. Przed sporządzeniem roztworu roboczego w opryskiwaczu należy przeprowadzić próbę mieszalności wszystkich składników.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produktu nie należy spożywać. W przypadku połknięcia skontaktuj się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu skontaktuj się z lekarzem. Stosować okulary oraz rękawice ochronne i odzież ochronną. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:



CALFERT



1L

masa netto 1.35 kg

DAWKOWANIE – aplikacja dolistna

Należy stosować zgodnie z etykietą i nie przekraczać zalecanych dawek.

Uprawa	Termin stosowania	Dawka
Jabłoń, grusza	Pierwszy zabieg wykonać w fazie zielonego pąka i powtórzyć po 7 dniach.	0,5-1,5 l/ha
	Kolejne zabiegi należy wykonać przed kwitnieniem oraz po kwitnieniu - w odstępie 7 dni.	0,5-1 l/ha
	Dwa-trzy ostatnie zabiegi wykonać po zbiorach owoców, w czasie przygotowania roślin do spoczynku zimowego, przed opadaniem liści. Zabiegi wykonywać co 7-14 dni.	1-1,5 l/ha
Wiśnia, czereśnia, brzoskwinia	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji.	0,5-1,5 l/ha
	Kolejne zabiegi należy wykonać przed kwitnieniem oraz po kwitnieniu - w odstępie 7 dni.	0,5-1 l/ha
	Dwa-trzy ostatnie zabiegi wykonać po zbiorach owoców, w czasie przygotowania roślin do spoczynku zimowego, przed opadaniem liści. Zabiegi wykonywać co 7-14 dni.	1-1,5 l/ha
Truskawki w polu i pod osłonami	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji lub 21 dni po wysadzeniu młodych roślin w miejsce stałe.	0,5-1,5 l/ha
	Kolejne zabiegi należy wykonać przed kwitnieniem oraz po kwitnieniu - w odstępie 7 dni.	0,5-1 l/ha
	Dwa-trzy ostatnie zabiegi wykonać w czasie przygotowania roślin do spoczynku zimowego, przed opadaniem liści. Zabiegi wykonywać co 7-14 dni.	1-1,5 l/ha
Malina i jeżyna w polu i pod osłonami	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji lub 21 dni po wysadzeniu młodych roślin w miejsce stałe.	0,5-1,5 l/ha
	Kolejne zabiegi należy wykonać przed kwitnieniem oraz po kwitnieniu - w odstępie 7 dni.	0,5-1 l/ha
	Dwa-trzy ostatnie zabiegi wykonać po zbiorach owoców, w czasie przygotowania roślin do spoczynku zimowego, przed opadaniem liści. Zabiegi wykonywać co 7-14 dni.	0,5-1 l/ha
Borówka wysoka	Pierwszy zabieg wykonać w fazie zielonego pąka i powtórzyć po 7 dniach.	0,5-1,5 l/ha
	Kolejne zabiegi należy wykonać przed kwitnieniem oraz po kwitnieniu - w odstępie 7 dni.	0,5-1 l/ha
	Dwa-trzy ostatnie zabiegi wykonać po zbiorach owoców, w czasie przygotowania roślin do spoczynku zimowego, przed opadaniem liści. Zabiegi wykonywać co 7-14 dni.	0,5-1,5 l/ha
Zboża ozime	Pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3-6 liści.	0,2-1 l/ha
	Dwa-trzy zabiegi co 7-14 dni wykonać wiosną.	0,2-1 l/ha
Zboża jare	Pierwszy zabieg wykonać w fazie 3-6 liści i powtórzyć po 7-14 dniach.	0,2-1 l/ha
Kukurydza	Pierwszy zabieg wykonać w fazie 4-8 liści właściwych.	0,5-1,5 l/ha
Ziemniaki	Drugi zabieg wykonać przed kwitnieniem.	0,5-1,5 l/ha
	Pierwszy zabieg wykonać w czasie formowania pędów.	1-1,5 l/ha
Rzepak	Drugi zabieg wykonać w czasie powstawania kwiatostanów.	1-1,5 l/ha
Burak cukrowy	Pierwszy zabieg wykonać jesienią, w fazie 4-8 liści. Drugi zabieg - wczesną wiosną w fazie formowania pędów bocznych, trzeci - w fazie intensywnego wzrostu (wydłużania łodygi).	1-1,5 l/ha
Rośliny strączkowe	Pierwszy zabieg wykonać w fazie 4-8 liści właściwych. Kolejne dawki stosować co 10-14 dni, dostosowując je do faz rozwojowych: faza 9 liści właściwych, wzrost rozety liściowej (przed zakryciem międzyrzędzi). Czwartą zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych objawów porażenia buraka chwościkiem.	0,5-1,5 l/ha
	Pierwszy zabieg wykonać w czasie rozwoju pędów bocznych.	0,5-1,5 l/ha
Pomidor, papryka	Drugi zabieg wykonać w czasie rozwoju pąków kwiatowych.	0,5-1,5 l/ha
Ogórek, dynia	Pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem.	0,5-1,5 l/ha
Kapusta głowiasta	Drugi zabieg wykonać po kwitnieniu i powtórzyć po 7 dniach.	0,5-1,5 l/ha
	Pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem.	0,5-1,5 l/ha
Kapusta pekińska	Pierwszy zabieg wykonać w czasie wiązania owoców i powtórzyć po 14 dniach.	0,5-1,5 l/ha
Kalafior, brokuł	Wykonywać 2-3 zabiegi co 7 dni od fazy 4. liścia.	0,5-1,5 l/ha
	Wykonywać zabiegi co 7-10 dni w czasie wzrostu i rozwoju liści.	0,5-1,5 l/ha
Marchewka, pietruszka	Pierwszy zabieg wykonać w czasie intensywnego wzrostu liści, kolejne zabiegi wykonać co 7 dni w okresie formowania róży oraz w czasie wzrostu i rozwoju róży.	0,5-1,5 l/ha
Seler	Pierwszy zabieg wykonać w czasie intensywnego wzrostu naci oraz w okresie grubienia korzenia.	0,5-1,5 l/ha
Fasola, groch	Pierwszy zabieg wykonać w okresie intensywnego rozwoju rozety liściowej. Drugi zabieg na początku grubienia korzenia, Trzeci - w fazie intensywnego grubienia korzenia.	0,5-1,5 l/ha
	Wykonywać dwa-trzy zabiegi co 7 dni w fazie kwitnienia i zawiązywania strąków.	0,5-1,5 l/ha

Nr Serii:

Data produkcji:

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. ul.Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. 22 456 19 65 biuro@calfert.pl www.calfert.pl