

Instrukcja stosowania

TRUSKAWKA

- dolistnie (przeciw Botrytis cinerea)
- stężenie 0,5%, 400 – 600 litrów cieczy roboczej na ha (oprysk drobnokroplisty)

POMIDOR, OGÓREK, PAPRYKA

- dolistnie (przeciw Botrytis cinerea i Didymella)
- stężenie 0,5% (oprysk drobnokroplisty)

SIEWKI WARZYW, ZIÓŁ I ROŚLIN OZDOBNYCH

- doglebowo (przeciw zgorzeli siewek i chorobom systemu korzeniowego wywołanego przez grzyby Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium)
- 200 – 500 g/ m³ (mieszanie z podłożem uprawowym)
- stężenie 0,5% (zraszanie i moczenie)

SADZONKI WARZYW, ZIÓŁ I ROŚLIN OZDOBNYCH

- doglebowo/fertygacja (przeciw chorobom systemu korzeniowego wywołanym przez Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium)
- 200 – 250 g/1000 roślin (doglebowo)
- stężenie 0,5% (fertygacja lub podlewanie)

Uwagi dot. stosowania

Wykazuje największe korzyści ze stosowania jako środek aplikowany prewencyjnie. Charakteryzuje się wysoką zdolnością, w różnych warunkach atmosferycznych, do przetrwania w ryzosferze i na nadziemnych częściach rośliny chroniąc ją przez kilka tygodni przed niekorzystnym działaniem grzybów chorobotwórczych. Zaleca się zachowanie karencji (odstępu) 0-7 dni dla fungicydów i 0-2 dni dla insektycydów (tabela karencji dostępna na życzenie). Nie mieszać ze ŚOR i roztworami ze stężonymi nawozami w jednym zbiorniku.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.



royal brinkman


global specialist in horticulture

LALLEMAND


LALLEMAND PLANT CARE

Prestop® WP biologiczny fungicyd

CLONOSTACHYS ROSEA
SZCZEP J1446



royalbrinkman.pl



Prestop® WP

Biologiczny fungicyd stosowany przeciwko szarej pleśni (*Botrytis cinerea*) oraz chorobom grzybowym systemu korzeniowego.

O produkcie

Prestop® jest biologicznym fungicydem do sporządzania zawiesiny do podlewania przeciw chorobom korzeni wywołane grzybami z rodzaju: *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia* i *Fusarium* oraz do opryskiwania roślin przeciw chorobom części nadziemnej wywołane grzybami z rodzaju *Botrytis* i *Didymella*. Mechanizm działania:

- poprzez szybką kolonizację systemu korzeniowego oraz nadziemnych części rośliny pozbawia grzyby patogeniczne przestrzeni do wzrostu i ogranicza ich dostęp do pożywiania;
- działanie saprofityczne polegające na rozkładzie martwej materii, będącej jednocześnie naturalną barierą dla grzybów pasożytniczych;
- nadpasożytnictwo polegające na wydzielaniu enzymów (β -1,3-glukanaza, chitynaza) rozkładających ścianę komórkową grzyba patogenicznego.

Czas działania i ochrony wynosi 3-4 tygodni dla części nadziemnych rośliny oraz 5-6 tygodni w przypadku aplikacji w strefie ryzosfery na różnych podłożach (substrat, torf, wełna mineralna, włókno kokosowe).

Skład

Grzybnia i zarodniki grzyba
Clonostachys rosea

Szczep J1446

2x10⁸ CFU/g 320 g/kg masy grzybni

Produkt w formie zwilżalnego proszku (WP).

Sposób stosowania

- dolistnie
- fertygacja
- zamgławiacze (zimna mgła)
- systemy podlewania i zraszania
- zmieszanie z podłożem uprawowym

Rodzaj uprawy

- pomidor i ogórek
- truskawka
- siewki i sadzonki warzyw, ziół i roślin ozdobnych

Korzyści ze stosowania



WYSOCE SKUTECZNY W WALCE Z CHOROBAМИ GRZYBOWYMI LIŚCI WYWOŁANE PRZEZ: BOTRYTIS I DIDYMELLA



WYSOCE SKUTECZNY W WALCE Z CHOROBAМИ GRZYBOWYMI KORZENI WYWOŁANE PRZEZ: PYTHIUM, PHYTOPHTORA, RHIZOCTONIA I FUSARIUM



BEZ OKRESU KARENCJI I BEZ POZOSTAŁOŚCI



BEZPIECZNY I NEUTRALNY DLA OWADÓW POŻYTECZNYCH (NP. TRZMIELI), MOŻE BYĆ RÓWNOLEGLIE STOSOWANY Z OCHRONĄ BIOLOGICZNĄ PRZECIWKO SZKODNIKOM



STYMULACJA SYSTEMU KORZENIOWEGO



ŚRODEK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, ZALECANY I ZAREJESTROWANY RÓWNIEŻ DO OCHRONY UPRAW EKOLOGICZNYCH