

Posiadacz zezwolenia:

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Republika Federalna Niemiec

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**Neudosan****Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych**

Zawartość substancji czynnej:

sól potasowa kwasów tłuszczowych– 515 g/l (49,66%)

Zezwolenie MRiRW nr R-45/2024 z dnia 21/03/2024

**Uwaga**

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy

P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 - Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.

P308 + 313

P391- Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Neudosan jest insektycydem o działaniu kontaktowym, w postaci koncentratu rozpuszczalnego (SL) w wodzie. Przeznaczony do zwalczania postaci dorosłych i larwalnych oraz jaj owadów i roztoczy. Na roślinie działa powierzchniowo.

Substancja czynna środka wykazuje fizyczny sposób działania na szkodniki i powoduje m.in. uszkodzenia kutikuli, a po wnikięciu do ciała szkodnika zaburzenia w osmoregulacji i w funkcjonowaniu układu oddechowego i nerwowego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz polowych lub opryskiwaczy ręcznych.

Jabłoń

Mszyce (z wyłączeniem bawełnicy korówki), przędziorki.

Maksymalne /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l/ha (17,5 l na 10 000 m² opryskiwanej powierzchni ściany liści - LWA)

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Grusza

Miodówki

Maksymalne /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l/ha (17,5 l na 10 000 m² opryskiwanej powierzchni ściany liści - LWA)

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Wiśnia

Mszyca wiśniowa i inne gatunki mszyc

Maksymalne /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l/ha

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Śliwa

Mszyca śliwowo-trzcinowa i inne gatunki mszyc

Maksymalne /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l/ha

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Ogórek, dynia zwyczajna, cukinia, melon, pomidor, papryka, oierzyna (w uprawie szklarniowej)

Mszyce, przędziorki, mączlik szklarniowy

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka dla upraw warzyw prowadzonych pionowo: 18,0 l na 10 000 m² opryskiwanej powierzchni ściany liści – LWA.

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pak choi, jarmuż, kapusta brukselska, brokuł zwyczajny, rzepa, kapusta pekińska (w uprawie polowej)

Mszyce

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Kalafior, kapusta pak choi, jarmuż, kapusta brukselska, brokuł zwyczajny, rzepa, kapusta pekińska (w uprawie szklarniowej)

Mączlik szklarniowy

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

Fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona (w uprawie polowej)

Mszyca burakowa

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Róża, chryzantema, bluszcz i inne rośliny ozdobne (w uprawie w szklarniowej)

Mszyce, przędziorki, mączlik szklarniowy

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody,

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody,

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Morela, czereśnia, brzoskwinia

Mszyce, miodówki, przędziorki

Maksymalne /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l /ha

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Grusza

Mszyce, przędziorki

Maksymalne /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l /ha (17,5 l na 10 000 m² opryskiwanej powierzchni ściany liści - LWA))

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1500 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Jeżyna, malina, borówka czarna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, jarząb, borówka amerykańska, bez czarny, borówka brusznica, żurawina

Mszyce

Maksymalne /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 l /ha

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Salata, cykoria, endywia, roszponka warzywna, szpinak, burak liściowy (boćwina), portulaka warzywna, rukola (w uprawie polowej)

Mszyce

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Salata, cykoria, endywia, roszponka warzywna, szpinak, burak liściowy (boćwina), portulaka warzywna, rukola (w uprawie szklarniowej)

Mszyce, mączliki

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

Rośliny zielarskie (w uprawie szklarniowej)

Mszyce, przędziorki, mączliki

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 900 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

Dynia makaronowa, dynia olbrzymia, dynia piżmowa, dynia zwyczajna, dynia zwyczajna typ użytkowy cukinia, dynia zwyczajna typ użytkowy kabaczek, dynia zwyczajna typ użytkowy patison, (w uprawie polowej)

Mszyce

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Melon, ogórek, pomidor, papryka, bakłażan (w uprawie polowej)

Mszyce

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody
Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.
Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Cebula, cebula siedmiolatka

Mszyce

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody
Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 900 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Marchew, rzodkiewka (w uprawie polowej i w uprawie szklarniowej)

Mszyce

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:
Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody
Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody
Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

Seler, brukiew, pasternak, rzodkiew, burak ćwikłowy, topinambur, salsefia (w uprawie polowej)

Mszyce

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:
Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody
Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody
Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Fasola wielokwiatowa uprawiana na świeże nasiona, fasola zwykła uprawiana na świeże nasiona, (w uprawie polowej)

Mszyce

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:
Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody
Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody
Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.
Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona, fasola zwykła uprawiana na suche nasiona (w uprawie polowej)

Mszyce (poza mszycą burakową)

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody.

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Groch zielony cukrowy, groch zielony luskowy (w uprawie polowej)

Mszycy burakowa

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 l/ha środka w 900 l wody

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 l/ha środka w 1350 l wody

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 l/ha środka w 1800 l wody

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Rośliny warzywne uprawiane na młode liście (w uprawie polowej i w szklarniowej)

Mszyce

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody: 18 l/ha środka w 900 l wody.

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 5

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

- Zaleca się stosowanie środka z dodatkiem produktu zapobiegającemu pienieniu.
- Należy zapewnić dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową, w tym spodniej strony liści. Należy jednak unikać bezpośredniego opryskiwania kwiatów.
- Zabiegi należy przeprowadzać późnym wieczorem, ewentualnie wczesnym rankiem, ponieważ środek
- wykazuje wyższą skuteczność w niższych temperaturach powietrza.
- Po zastosowaniu środka, zwłaszcza w uprawach szklarniowych, mogą wystąpić uszkodzenia roślin w
- przypadku silnej ekspozycji na światło słoneczne.
- Przed zastosowaniem środka na całą powierzchnię uprawy (zwłaszcza roślin ozdobnych, w tym nowych

- gatunków i odmian) zaleca się, na 10-14 dni przed planowanym zabiegiem, sprawdzić działanie środka na mniejszej powierzchni celem wykluczenia ewentualnej fitotoksyczności. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, przy włączonym mieszałde uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Niewymagany

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nadmierny kontakt ze środkiem może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Środek jest szkodliwy dla populacji istotnych owadów pożytecznych.
Środek jest toksyczny dla glonów.
Środek jest toksyczny dla ryb i organizmów będących pokarmem dla ryb.
Środek jest klasyfikowany jako szkodliwy dla populacji owadów zapylających. W czasie kwitnienia roślin uprawnych, zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł.

Drzewa ziarnkowe, drzewa pestkowe, krzewy jagodowe.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Rośliny kapustne, rośliny cebulowe, rośliny korzeniowe, rośliny bulwiaste, rośliny liściaste i lodygowe, zioła, rośliny warzywne uprawiane na młode liście.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Rośliny dyniowate, rośliny strączkowe, pomidor, papryka, oberżyna.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Rośliny ozdobne wysokość roślin < 50 cm

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Rośliny ozdobne wysokość roślin > 50 cm

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

UWAGA:

Nie wyznacza się stref ochronnych w przypadku zastosowania środka w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

- Chronić przed dziećmi.
- Środek ochrony roślin przechowywać:
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w dobrze wentylowanym miejscu.
- szczelnie zamknięty.

Chronić przed mrozem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Zalecana temperatura przechowywania: 20°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku narażenia inhalacyjnego: Zapewnić dostęp do świeżego powietrza.

W przypadku kontaktu ze skórą: należy spłukać wodą.

W przypadku kontaktu z oczami: przemyć dokładnie dużą ilością wody.

W przypadku połknięcia: wypić dużą ilość wody i zasięgnąć porady lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -