

Porównanie środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania przędziorka i roztocza

Środek	Substancja aktywna	Grupa chemiczna	Temperatura Stosowania	Zwalczane Stadia Rozwojowe	Zwalczany szkodnik	Ilość zabiegów	pH cieczy	Działanie
Ortus 05 SC	Fenipiroksymat	Fenoksypirazole	15-25	Stadia ruchome	Roztocz truskawkowiec/ Przędziorek	1	5-7	Powierzchniowe
Acaramik 018 EC	Abamektyna	Laktony makrocycliczne	10-25	Stadia ruchome	Roztocz truskawkowiec/ Przędziorek	1	4-5	Wgłębne
Koromite 10 EC	Milbemektyna	Laktony makrocycliczne	10-25	Wszystkie stadia rozwojowe	Roztocz/ Przędziorek	2	4-6	Powierzchniowe, wgłębne
Milbeknock 10 EC	Milbemektyna	Laktony makrocycliczne	10-25	Wszystkie stadia rozwojowe	Roztocz/ Przędziorek	2	4-6	Powierzchniowe, wgłębne
Movento 100 SC	Spirotetramat	Ketoenole	15-25	Stadia ruchome	Roztocz	2	4-5	Systemiczne
Nissorun Strong 250 SC	Heksytizoks	Tiazolidyny	15-25	Jaja, larwy	Przędziorek	1	6-7	Powierzchniowe
Floramite 240 SC	Bifenazat	Karbazyniany	15-25	Wszystkie stadia rozwojowe	Przędziorek	2	5-7	Powierzchniowe

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.